

PENGARUH PEMBERIAN
DAPHNIA TERHADAP
KELULUSHIDUPAN DAN
PERTUMBUHAN LARVA
LOBSTER AIR TAWAR (*Cherax
quadricarinatus*)

by Ernawati Ernawati

Submission date: 03-Nov-2021 01:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 1691802935

File name: 3_2013_PENGARUH-PEMBERIAN-DAPHNIA-TERHADAP-KELULUSHIDUPAN.pdf (114.04K)

Word count: 2249

Character count: 13554

**PENGARUH PEMBERIAN DAPHNIA TERHADAP KELULUSHIDUPAN
DAN PERTUMBUHAN LARVA LOBSTER AIR TAWAR (*Cherax
quadricarinatus*)**

*The Influence of Daphnia Distribution to Survival Rate
and Growth of Fresh Water Crayfish Larvae (*Cherax quadricarinatus*)*

Ernawati, Rekna Wahyuni
Faculty of Agriculture, Yudharta University, Pasuruan, 67162, East Java, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif pakan alami bagi larva lobster air tawar dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti dan masyarakat tentang pengaruh pemberian daphnia terhadap kelulushidupan dan pertumbuhan larva lobster air tawar, sehingga dapat merangsang tumbuhnya usaha budidaya hasil perikanan yang dapat berpeluang untuk menjadi komoditas ekspor unggulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai kelulushidupan (SR) larva lobster air tawar selama 42 hari masa pemeliharaan yaitu antara 86,67%-90%, berat rata-rata mengalami peningkatan, laju pertumbuhan sesaat (SGR) tidak berpengaruh nyata, sedangkan rasio konversi pakan terbaik adalah perlakuan penambahan daphnia 14% dari berat tubuh. Hasil pengukuran kualitas air pada kisaran suhu 18,33-19,88 OC, oksigen terlarut (DO) 4,73-4,84 mg/l, dan pH 7,12-7,30, sehingga masih layak untuk hidup dan tumbuh larva lobster air tawar.

Kata kunci : Daphnia, Lobster air tawar, pakan alami

ABSTRACT

This research is meant to provide an alternative natural food for the larvae of freshwater crayfish and is expected to provide information to researchers and the public about the influence of Daphnia on survival rate and growth of larvae of freshwater crayfish, which can stimulate the growth of the cultivation of fish which can be likely to become commodity exports seed. The result showed survival rate (SR) freshwater lobster seed for 42 days maintenance period is between 86.67% -90%, average weight increased, specific growth rate (SGR) had no significant effect, whereas the best feed conversion ratio Daphnia is the addition of treatment 14% of the body weight. Results of water quality measurements in the temperature range from 18.33 to 19.88 OC, dissolved oxygen (DO) from 4.73 to 4.84 mg / l, and pH 7.12 to 7.30, so it is still worth it to live and grow freshwater crayfish larvae.

Key words : Daphnia. Fresh Water Crayfish, Natural feed

PENDAHULUAN

Lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*) merupakan salah satu komoditi perikanan yang mempunyai

bentuk tubuh yang unik dan juga memiliki warna khas dan beragam. Lobster yang dikenal oleh masyarakat selama ini adalah udang yang berasal dari tangkapan di laut dan belum bisa

dibudidayakan. Sedangkan lobster air tawar sudah bisa dibudidayakan baik di akuarium maupun di kolam dan tidak dibutuhkan lahan yang luas (Anonymous, 2000). Menurut Iskandar (2003), hidangan lobster air tawar digemari karena dagingnya yang padat, pejal, empuk dan rasanya cukup gurih, terutama jika dibandingkan dengan lobster air laut atau jenis udang lainnya. Lobster air tawar juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi terutama protein.

Sebenarnya permintaan pasar terutama pasar ekspor terhadap lobster air tawar cukup tinggi. Sejumlah negara telah meminta lobster air tawar, baik dalam keadaan hidup maupun beku. Jepang merupakan potensi pasar yang paling besar di Asia. Selain Jepang, negara Asia lainnya seperti Malaysia, Hongkong, Cina, Taiwan, Korea dan Singapura juga mengimpor lobster. Negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Belanda, Jerman, Belgia, Selandia Baru dan Australia juga menggemari lobster air tawar sebagai makanan favorit. Sedangkan pasar lobster dalam negeri seperti Jakarta, Surabaya dan Bali juga cukup ramai (Wiyanto dan Hartono, 2003).

Masa larva, terutama setelah melepaskan diri dari induknya, merupakan salah satu masa yang kritis dari seluruh siklus hidup lobster air tawar selain masa *moulting*. (Anonymous, 2005; Jacinto, 2003). Menurut Djajasewaka (1985), untuk melewati masa kritis tersebut, hal penting yang harus diperhatikan adalah pemberian pakan tambahan. Pakan tambahan bisa berupa pelet dan pakan alami.

Daphnia merupakan alternatif pakan alami yang merupakan jenis *zooplankton*. Pakan alami ini mempunyai beberapa kelebihan karena ukurannya relatif kecil dan sesuai

dengan bukaan mulut larva / benih ikan, nilai nutrisinya tinggi, mudah dibudidayakan, gerakannya dapat merangsang ikan untuk memangsanya, dapat berkembang biak dengan cepat sehingga ketersediaannya dapat terjamin, dan biaya pembudidayaannya relatif murah (Mujiman, 2000).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian daphnia terhadap kelulus hidupan dan pertumbuhan larva lobster air tawar selama masa pemeliharaan.

Bahan dan Metode

Bahan

Bahan yang dipakai adalah larva lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*) berumur 1 hari, berasal dari pembudidaya lobster di Malang Jawa Timur dan *Daphnia sp* yang diperoleh dengan cara mendapatkannya di Balai Benih Ikan Punten Batu.

Alat

Peralatan yang dipakai untuk penelitian ini meliputi akuarium, perangkat *aerator*, pH meter, oksimeter, timbangan analitik, pipa paralon dan selang penyipon.

25 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, yaitu serangkaian percobaan untuk melihat suatu hasil (Amirin, 1990; Surachmad, 1989). Parameter utama yang diukur adalah kelulushidupan (SR) dan laju pertumbuhan (SGR) serta tingkat konversi pakan (FCR). Sedangkan parameter penunjang adalah kualitas air media meliputi suhu, oksigen terlarut dan pH. Kualitas air diukur setiap hari sebanyak 2 (dua) kali pada pagi dan sore hari.

7 Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL).

A = Pemberian daphnia dengan dosis 14 % dari berat tubuh

B = Pemberian daphnia dengan dosis 16 % dari berat tubuh

C = Pemberian daphnia dengan dosis 18 % dari berat tubuh

D = Pemberian daphnia dengan dosis 20 % dari berat tubuh

Pelaksanaan Penelitian

- persiapan meliputi : persiapan alat, pakan dan benih larva.
- Pengisian akuarium sebanyak perlakuan, masing-masing akuarium diisi 10 ekor larva
- Pemberian Daphnia 2x sehari pada pagi dan sore hari sesuai dosis perlakuan dengan ketentuan perbandingan 40% pagi dan 60% sore.
- Pengukuran kualitas air : meliputi suhu, DO, dan pH setiap hari pada pagi dan sore hari.
- Pengamatan 7 hari sekali meliputi :

a. Tingkat Kelulushidupan / Survival Rate (SR) (Heinsbroek, 1989)

21 Kelangsungan hidup dapat dihitung dengan rumus $SR = \frac{N_t}{N_0} \times 100\%$

N_0

Dimana : SR = Kelulushidupan larva lobster air tawar (%)

N_t = Jumlah larva yang hidup pada akhir penelitian (individu)

N_0 = Jumlah larva yang hidup pada awal penelitian (individu)

b. Laju pertumbuhan Sesaat / Specific Growth Rate (SGR) (Heinsbroek, 1989)

Laju pertumbuhan sesaat dihitung berdasarkan :

$$SGR = \frac{\ln W_t - \ln W_0}{t} \times 100 \%$$

dimana SGR = laju pertumbuhan sesaat (% BW / hari)

W_t = Berat rata-rata individu pada akhir penelitian (gr)

W_0 = Berat rata-rata individu pada awal penelitian (gr)

t = Lama penelitian (hari)

c. Rasio Konversi Pakan (Feed Conversion Ratio / FCR) (Heinsbroek, 1989)

$$FCR = \frac{F \times BKf}{W_t - W_0}$$

Dimana F = Jumlah pakan yang diberikan

W_t = Berat rata-rata individu pada waktu tertentu

W_0 = Berat rata-rata individu awal penelitian (gr)

BKf = Berat kering makanan


19 Analisis Data

Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis keragaman atau uji F (tabel sidik ragam selang kepercayaan 95% dan 99%). Apabila hasil tabel sidik ragam memberikan hasil berbeda nyata atau berbeda sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT (Uji Beda Nyata Terkecil).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kelulushidupan (Survival Rate / SR)

Tingkat kelangsungan hidup lobster air tawar selama penelitian ditampilkan pada Gambar 1.




Gambar 1. Grafik kelulushidupan (SR) larva lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*) selama penelitian

Pada Gambar 1, perlakuan pemberian daphnia dengan dosis 20% dari berat tubuh (D) memberikan kelulushidupan yang tertinggi dibandingkan yang lain. Hal ini berhubungan dengan pemberian pakan yang cukup sehingga mengurangi sifat kanibalisme pada lobster air tawar. Kematian yang terjadi selama penelitian dikarenakan beberapa hal. Menurut Patasik (2004), lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*) memiliki sifat kanibal terutama pada masa awal kehidupannya. Hal itu menyebabkan terjadinya kematian selama penelitian. Disamping itu lobster air tawar yang dijadikan penelitian adalah yang baru berumur 1 hari, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Selain itu sifat kanibal juga muncul pada lobster sehat terhadap lobster yang sedang mengalami ganti kulit.

Laju Pertumbuhan Sesaat (*Spesific Growth Rate / SGR*)


Parameter utama kedua yang diukur dalam penelitian ini adalah laju pertumbuhan sesaat (SGR) larva lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*). Laju pertumbuhan sesaat merupakan persentase berat rata-rata individu perhari. Berdasarkan data berat rata-

rata larva lobster setiap minggunya untuk tiap-tiap perlakuan diperoleh grafik pertumbuhan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2.. Grafik rerata pertambahan berat individu larva lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*) selama penelitian

Pada Gambar 2 terlihat bahwa rerata pertambahan berat individu larva lobster air tawar tertinggi setelah 42 hari (6 minggu) masa pemeliharaan dicapai pada perlakuan A (14%) dan rata-rata terendah pada perlakuan D (20%). Berdasarkan data rerata pertambahan berat individu larva lobster air tawar, kemudian dilakukan penghitungan laju pertumbuhan sesaat, diketahui bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap laju pertumbuhan sesaat lobster yang diteliti. Hasil yang tidak berbeda nyata disebabkan nilai rata-rata laju pertumbuhan sesaat memiliki sebaran yang sempit, yaitu berkisar antara 4,27 – 4,71. Grafik rata-rata laju pertumbuhan sesaat dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Grafik laju pertumbuhan sesaat (SGR) larva lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*) selama penelitian

Masing-masing perlakuan memberikan laju pertumbuhan yang hampir sama. Pada perlakuan A (14%) menunjukkan laju pertumbuhan sesaat yang terbaik yaitu 4,46 % BW/hari. Laju pertumbuhan sesaat semakin menurun dengan meningkatnya dosis pemberian pakan, yang terendah adalah perlakuan D (20%) sebesar 4,31 % BW/hari. Menurunnya laju pertumbuhan sesaat disebabkan oleh bertambahnya dosis pemberian pakan alami *daphnia*. Hal ini berhubungan dengan bertambahnya biomass yang ada dalam wadah perlakuan yang makin padat, sehingga terjadi penurunan oksigen. Dengan demikian laju pertumbuhan juga semakin menurun.

Berat rata-rata larva pada akhir penelitian adalah 0,33 dan nilai rata-rata laju pertumbuhan sesaat (SGR) larva lobster air tawar selama penelitian berada dalam kisaran 4,31 – 4,46 & BW/hari yang berarti memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai SGR pada penelitian Jacinto *et al.* (2003) yaitu 2,97 – 3,64 % BW/hari dengan berat rata-rata larva adalah 1,08 gram. Menurut Wiyanto dan Hartono (2004), semakin kecil lobster maka laju pertumbuhannya semakin tinggi. Demikian sebaliknya semakin besar lobster maka laju pertumbuhannya semakin menurun.

Rasio Konversi Pakan (Feed Conversion Ratio / FCR)

Rasio Konversi Pakan (FCR) merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang diberikan dengan pertambahan berat badan lobster air

tawar selama penelitian (Heinsbroek, 1989). Rasio konversi pakan selama penelitian dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini :



Gambar 4. nilai rasio konversi pakan (FCR) larva lobster air tawar selama penelitian

Berdasarkan sidik ragam diketahui bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap rasio konversi pakan larva lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*). Untuk mengetahui perlakuan mana yang terbaik, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Berdasarkan hasil uji BNT diketahui bahwa perlakuan D memberikan hasil yang berbeda sangat nyata terhadap perlakuan C, sedangkan perlakuan C memberikan hasil yang berbeda sangat nyata terhadap B dan perlakuan B memberikan hasil yang berbeda sangat nyata terhadap perlakuan A.

Semakin tinggi dosis pakan yang diberikan membuat nilai konversi pakan semakin tinggi. Pada perlakuan A memberikan hasil terbaik dengan nilai konversi pakan yang lebih rendah mengartikan nilai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan yang lain. Sedangkan perlakuan D memberikan nilai konversi pakan yang paling tinggi mengartikan nilai efisiensi pakan yang semakin rendah.

Rasio konversi pakan adalah suatu nilai efisiensi penggunaan pakan,

semakin rendah nilai FCR maka semakin sedikit pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit berat badan larva lobster air tawar (Buwono, 2000). Semakin rendah nilai FCR maka semakin baik, karena biaya produksi dapat diperkecil sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin besar.

17

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

- Pemberian pakan alami daphnia sp dengan dosis yang berbeda (14%; 16%; 18% dan 20%) memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap kelulushidupan dan pertumbuhan sesaat larva lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*)
- Tingkat kelulushidupan larva lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*) relatif cukup tinggi dengan kisaran rata-rata yaitu 86 – 90 %.
- Pemberian pakan alami *Daphnia sp* dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap rasio konversi pakan larva lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*)
- Nilai rata-rata rasio konversi pakan yang terbaik adalah perlakuan A (14%) yaitu 0,43 dan yang terendah adalah perlakuan D (20%) sebesar 0,68
- Kualitas air media berdasarkan pengukuran selama penelitian adalah homogen dan masih berada pada kisaran yang layak untuk hidup dan tumbuh larva lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*) dengan suhu berkisar antara 18,33 – 19,88 °C, dan oksigen terlarut (DO) antara 4,73 – 4,84 mg/l, serta derajat keasaman (pH) antara 7,12 – 7,30.

Saran

- Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pemberian pakan alami *Daphnia sp* dengan menggunakan dosis yang lebih rendah dari 14 %.
- Perlu dikembangkan usaha budidaya pakan alami *Daphnia sp* sebagai bahan pakan alternatif untuk lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*) karena harganya relatif murah dan mempunyai nilai gizi cukup tinggi sebagai makanan ikan atau lobster air tawar.

13

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dirjen Dikti yang telah membiayai penelitian ini melalui Program Penelitian Dosen Pemula.

DAFTAR PUSTAKA

Amirin. 1990. Menyusun Rencana Penelitian. Rajawali Pers. Jakarta

Anonymous. 2000. Crayfish. [http://www.enchantedlearning.com/cgibin/uncgi/search? Key =crayfish.](http://www.enchantedlearning.com/cgibin/uncgi/search?Key=crayfish) Akses : April 2007

-----, 2005. Aquaculture of Non Endemic Species-Redclaw Crayfish. [http://www.fish.wa.gov.au/docx/mp/mp100/index.php.](http://www.fish.wa.gov.au/docx/mp/mp100/index.php) Akses : Mei 2007

22

Djajasewaka, H. 1985. Pakan Ikan. CV Yasaguna. Jakarta

20

Buwono. 2000. Kebutuhan Asam Amino Esensial dalam Ransum Ikan. Kanisius. Yogyakarta

Heinsbroek, LTW. 1989. Growth and Feeding of Fish. Nuffic / Unibraw / Luw/Fish. Unibraw. Malang

3
Iskandar. 2003. *Budidaya Lobster Air Tawar*. Agromedia Pustaka. Jakarta

8
Jacinto, EC. 2003. *Effect of Dietary Protein Level on Growth and Survival of Juvenile Freshwater Crayfish Cherax quadricarinatus*. *Aquaculture Nutrition*. Volume 9

6
Mujiman, A. 2000. *Makanan Ikan*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Murtidjo, BA. 2001. *Pedoman Meramu Pakan Ikan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta

15
Patasik, S. 2004. *Pembenihan Lobster Air Tawar Lokal Papua*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Surachmad, W. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar. Metode dan Teknik Edisi VII*. Tarsito. Bandung

10
Wiyanto, RH dan Hartono, R. 2003. *Lobster Air Tawar Pembenuhan dan Pembesaran*. Penebar Swadaya. Jakarta

Wiyanto. RH dan Hartono, R. 2004. *Merawat Lobster Hias di Aquarium*. Penebar Swadaya. Jakarta

PENGARUH PEMBERIAN DAPHNIA TERHADAP KELULUSHIDUPAN DAN PERTUMBUHAN LARVA LOBSTER AIR TAWAR (*Cherax quadricarinatus*)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Mulyana Mulyana¹, Rosmawati Rosmawati, Muhammad azmi Rafi. "PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH LOBSTER AIR TAWAR (*Cherax quadricarinatus*) YANG DIBERI PAKAN BUATAN BERBAHAN BAKU TEPUNG KEONG MAS (*Pomacea sp.*)", *JURNAL MINA SAINS*, 2019

Publication

1%
- 2 Eko Prasetio, Eka Indah Raharjo, Ispandi .. "PENGARUH PADAT TEBAR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN JELAWAT (*Leptobarbus hoeveni*)", *Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan*, 2017

Publication

1%
- 3 Kedis Lengka, Magdalena Kolopita. "Teknik Budidaya Lobster (*Cherax quadricarinatus*) Air Tawar di Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Tatelu", *e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN*, 2013

Publication

1%

4

Pulinus Mambrasar, Revol Monijung, Ockstan Kalesaran, Juliaan Ch Watung. "Sintasan Dan Pertumbuhan Larva Ikan Ikan Lele (*Clarias* sp) Hasil Penetasan Telur Melalui Penambahan Madu Dalam Pengenceran Sperma", e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN, 2019

Publication

1 %

5

Titin Kurniasih. "LOBSTER AIR TAWAR (*Parastacidae: Cherax*), ASPEK BIOLOGI, HABITAT, PENYEBARAN, DAN POTENSI PENGEMBANGANNYA", Media Akuakultur, 2008

Publication

1 %

6

Yuni Tri dea Vega, Eka Indah Raharjo, Farida Farida. "PENGUNAAN TEPUNG DAUN TURI (*Sesbania grandiflora*) DALAM PAKAN BUATAN UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP IKAN GURAMI (*Osphronemus gouramy*)", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2018

Publication

1 %

7

Hidayat Suryanto Suwoyo, Sri Redjeki Hesti Mulyaningrum, Rachman Syah. "PERTUMBUHAN, SINTASAN DAN PRODUKSI IKAN NILA MERAH (*Oreochromis niloticus*) YANG DIBERI KOMBINASI PAKAN KOMERSIL

1 %

DAN AMPAS TAHU HASIL FERMENTASI",
BERITA BIOLOGI, 2018

Publication

8

E Cortes-jacinto. "Effect of dietary protein level on the growth and survival of pre-adult freshwater crayfish *Cherax quadricarinatus* (von Martens) in monosex culture", *Aquaculture Research*, 1/2004

Publication

9

Rachimi ., Farida ., Didik Susanto. "PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP LARVA IKAN BAUNG (*Mystus nemurus*) DENGAN KEDALAMAN AIR YANG BERBEDA", *Jurnal Buletin Al-Ribaath*, 2015

Publication

10

Agus Waluyo, Mulyana Mulyana, Fauzan Ali. "Tingkat Kelangsungan Hidup Dan Pertumbuhan Udang Galah (*Macrobrachium Rosenbergii* De Man) Pada Media Bersalinitas", *JURNAL MINA SAINS*, 2019

Publication

11

Holil Pathan Nur, Agung Kusuma Wijaya, Liman Liman, Muhtarudin Muhtarudin. "PENGARUH SKARIFIKASI MENGGUNAKAN URIN KAMBING PADA BIJI GAMAL (*Gliricida sepium*) DENGAN WAKTU PERENDAMAN BERBEDA TERHADAP KUALITAS BENIH", *Jurnal*

1 %

1 %

1 %

1 %

Riset dan Inovasi Peternakan (Journal of Research and Innovation of Animals), 2021

Publication

12

Salmah Lafina, Marisi Napitupulu. "The Effect of Compost and Phonska Fertilizer on the Growth and Yield of Sweet Corn (*Zea mays saccharata*) Varieties of Bonanza.", AGRIFOR, 2018

Publication

1 %

13

Yudin Ibrahim, I K. Suwetja, Feny Mentang. "Fatty acid profile of mixed tuna (*Euthynnus* spp.) oil and catfish (*Clarias* sp.) oil in different combinations", AQUATIC SCIENCE & MANAGEMENT, 2016

Publication

1 %

14

Agung Setia Abadi, Anik Martinah Hariati, Ellana Sanoesi. "Efek Penambahan Vitamin C Terhadap Laju Pertumbuhan Spesifik Ikan Pelangi Merah (*Glossolepsis incisus* Weber)", Jurnal Airaha, 2018

Publication

<1 %

15

Sj. Djunaidi, Eka Indah Raharjo, Farida .. "PENGARUH TEMPAT PERLINDUNGAN YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP LOBSTER AIR TAWAR CAPIT MERAH (*Cherax quadricarinatus*)", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2017

Publication

<1 %

-
- 16 Susisusanty Imban, A Rumambi, S S Malalantang. "PENGARUH PEMANFAATAN BOKASHI FESES SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN SORGUM VARIETAS KAWALI", ZOOTEC, 2016
Publication <1 %
-
- 17 Mafrian Kris Maraja, Netty Salindeho, Jenki Pongoh. "PENANGANAN IKAN NILA (*Oreochromis niloticus*) HIDUP DENGAN DENGAN MENGGUNAKAN ES SEBAGAI PENGAWET", MEDIA TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN, 2017
Publication <1 %
-
- 18 Rinaldi Kuhu, Rose O.S.E Mantiri, John L. Tombokan. "Some Biological Aspects of Freshwater Lobsters, *Cherax quadricarinatus*, in Ralik River of Southeast Minahasa and in Tondano Lake of Minahasa", JURNAL ILMIAH PLATAX, 2018
Publication <1 %
-
- 19 Rizky Amrullah. "Gula Darah Dan Mortalitas Benih Ikan Nilem (*Osteochilus hasselti*) Yang Di Pelihara Pada Media Salinitas Berbeda", JURNAL MINA SAINS, 2015
Publication <1 %
-
- 20 Apriani P Rihi. "Pengaruh Pemberian Pakan Alami dan Buatan terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Benih Ikan Lele Dumbo <1 %

(*Clarias gariepinus* Burchell.) di Balai Benih Sentral Noekele Kabupaten Kupang", *Bio-Edu: Jurnal Pendidikan Biologi*, 2019

Publication

21

Edwar Arunde, Hengki J Sinjal, Revol D. D Monijung. "Pengaruh penggunaan substrat yang berbeda terhadap daya tetas telur dan sintasan hidup larva ikan lele sangkuriang (*Clarias sp*)", *e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN*, 2016

Publication

<1 %

22

Dairi Y.L Airin, Cyska Lumenta. "Pakan diameter berbeda bagi pertumbuhan benih sidat (*Anguilla sp*)", *e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN*, 2015

Publication

<1 %

23

Diah Ikasari, Syamdidi Syamdidi, Theresia Dwi Suryaningrum. "Kajian Fisiologis Lobster Air Tawar (*Cherax quadricarinatus*) pada Suhu Dingin Sebagai Dasar untuk Penanganan dan Transportasi Hidup Sistem Kering", *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*, 2008

Publication

<1 %

24

Jimmy Mamuaya, Winda M. Mingkid, Ockstan J. Kalesaran, Hengky J. Sinjal, Reiny A. Tombol, John L. Tombokan. "The Survival Rate and Growth of Juvenile Crayfish (*Cherax*

<1 %

quadricarinatus) With Different Types of Shelter", JURNAL ILMIAH PLATAX, 2019

Publication

25

Nurina Rahmawati. Jurnal Ilmiah Fillia Cendekia, 2020

Publication

<1 %

26

Rachimi ., Eka Indah Raharjo, Didin Anggoro Putra. "PENGARUH PENAMBAHAN KAPUR TOHOR (CaO) PADA MEDIA BUDIDAYA BERSALINITAS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP LOBSTER AIR TAWAR (Cherax quadricarinatus)", Jurnal Ruaya : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Perikanan dan Kelautan, 2016

Publication

<1 %

27

Rifky Pujautama, Muarif Muarif, Mulyana Mulyana. "RASIO KONVERSI PAKAN DAN MORTALITAS IKAN BANDENG YANG DIBUDIDAYA PADA TAMBAK SILVOAKUAKULTUR", JURNAL MINA SAINS, 2020

Publication

<1 %

28

Arif Faisal Siburian, Kukuh Nirmala, Eddy Supriyono. "EVALUASI PENGGUNAAN JENIS SELTER BERBEDA TERHADAP RESPONS STRES DAN KINERJA PRODUKSI PENDEDERAN LOBSTER AIR TAWAR Cherax quadricarinatus

<1 %

DALAM SISTEM RESIRKULASI", Jurnal Riset
Akuakultur, 2019

Publication

29

Beny Setiyo Budi, Andi Rahmad R Rahim,
Muh. Sulaiman Dadiono. "PENGARUH JENIS
SUBSTRAT YANG BERBEDA TERHADAP
SINTASAN DAN PERTUMBUHAN LOBSTER AIR
TAWAR (*Cherax quadricarinatus*", Jurnal
Perikanan Pantura (JPP), 2019

Publication

<1 %

30

Ongki Doni Satriawan, Zulkhasyni Zulkhasyni,
Andriyeni Andriyeni, Dedi Pardiansyah, Firman
Firman. Jurnal Agroqua: Media Informasi
Agronomi dan Budidaya Perairan, 2021

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PENGARUH PEMBERIAN DAPHNIA TERHADAP KELULUSHIDUPAN DAN PERTUMBUHAN LARVA LOBSTER AIR TAWAR (*Cherax quadricarinatus*)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
